



Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

# Обережно – кір! Що робити, аби не захворіти під час спалаху

З огляду на спалах кору у трьох українських областях, Міністерство охорони здоров'я підготувало рекомендації, що допоможуть не допустити подальшого розповсюдження захворювання.





Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

На початок вересня в Україні захворіли **1627 людей**. Здебільшого це діти, однак хворіє і чимало дорослих, повідомляє **МОЗ**.

Найбільше хворіють в **Івано-Франківській** (747 випадків), **Одеській** (589 випадків) та **Тернопільській** (70 випадків) областях. Двоє дітей в Одеській області померли.

Здебільшого на кір хворіють діти. Однак реєструється значне число захворілих серед дорослих.

Так, цього року в Івано-Франківській області захворіли **591 дітей** (79% від усіх захворілих), Одеській – **389 дітей** (66% від усіх захворілих) та Тернопільській – **57 дітей** (81% від усіх захворілих).

У відомстві наголошують, що головна причина спалахів кору – низький рівень охоплення вакцинацією. Зазвичай хворіють ті, хто не був щеплений проти кору.

Для захисту від кору необхідно отримати **дві дози вакцини КПК**(проти кору, паротиту та краснухи).

У МОЗ також просять батьків **дітей віком від 1 до 9 років**, якщо вони пропустили першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, зробити це якомога швидше.

Дітям, яким скоро виповнюється **1 рік або 6 років**, важливо зробити щеплення за календарем щеплень.



"Закликаємо батьків по всій Україні, не лише там, де є спалахи, вакцинувати дітей, щоби вберегти їх від такого небезпечного захворювання, як кір. Кір є однією з головних причин дитячої смертності у світі", – йдеться у повідомленні відомства.



Кір проявляється високою температурою, нежитем, кашлем, висипом, іноді до симптомів додаються блювання і пронос.

Він небезпечний тим, що може ускладнитися пневмонією чи викликати ураження головного мозку.

# КІР В УКРАЇНІ

## СИМПТОМИ ХВОРОБИ

- ◆ ЗНАЧНЕ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ - ЧЕРЕЗ **10-12 ДНІВ** ПІСЛЯ ЗАРАЖЕННЯ, ТРИВАЄ **4-7 ДНІВ**
- ◆ НЕЖИТЬ
- ◆ КАШЕЛЬ
- ◆ ПОЧЕРВОНІННЯ ОЧЕЙ І СЛЬОЗОТЕЧА
- ◆ ДРІБНІ БІЛІ ПЛЯМИ НА ВНУТРІШНІЙ ПОВЕРХНІ ЩІК
- ◆ ВИСИП - З'ЯВЛЯЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ КІЛЬКА ДНІВ, ТРИМАЄТЬСЯ **5-6 ДНІВ**, ПОЧИНАЄТЬСЯ З ОБЛИЧЧЯ І ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ ШИЇ



## УСКЛАДНЕННЯ

НАЙЧАСТІШЕ - У ДІТЕЙ ДО **5 РОКІВ** ТА ДОРΟΣЛИХ

- СЛІПОТА
- ЕНЦЕФАЛІТ
- ВАЖКА ДІАРЕЯ ТА ЗНЕВОДНЕННЯ
- ВУШНІ ІНФЕКЦІЇ
- ПНЕВМОНІЯ

## ЯК ПЕРЕДАЄТЬСЯ ХВОРОБА

- КАШЕЛЬ
- ЧХАННЯ
- ТІСНИЙ ОСОБИСТИЙ КОНТАКТ
- ЧЕРЕЗ ХВОРОГО ЗА ЧОТИРИ ДНІ ДО ТА ПІСЛЯ ПОЯВИ У НЬОГО ВИСИПУ
- ВІРУС АКТИВНИЙ У ПОВІТРІ АБО НА ІНФІКОВАНИХ ПОВЕРХНЯХ 2 ГОДИНИ



## ЩО РОБИТИ, АБИ НЕ ЗАХВОРИТИ

- ВАКЦИНУВАТИСЯ
- У ЛЮДЕЙ, ЩО ПЕРЕХВОРИЛИ НА КІР, ВИРОБЛЯЄТЬСЯ ІМУНІТЕТ НА ВСЕ ЖИТТЯ.

## Симптоми кору



підвищення температури



нежить, сухий кашель



головний біль, слабкість



почервоніння і набряклість у горлі



подразнення очей чутливість до світла



збільшення шийних лімфатичних вузлів

# ЕПІДЕМІЯ КОРУ В УКРАЇНІ

## ОСНОВНІ СИМПТОМИ ХВОРОБИ



ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА



ЗАПАЛЕННЯ СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК ПОРОЖНИНИ РОТА І ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ



ПЛЯМИСТО-ПАПУЛЬОЗНИЙ ВИСІП ШКІРИ



25%



ПАЦІЕНТІВ, ЯКІ ВИЖИЛИ, ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕВИЛІКОВНІ БАДИ. ОСОБЛИВО СКЛАДНО ПРОТІКАЄ ЗАХВОРЮВАННЯ У МАЛЕНЬКИХ ДІТЕЙ



# КІР

гостре інфекційне вірусне захворювання з високим рівнем сприйнятливості

ЛІКІВ ВІД КОРУ НЕ ІСНУЄ!!!

КІЛЬКІСТЬ СПРИЙНЯТЛИВИХ ОСІБ, ЯКІ ЗАХВОРІЮЮТЬ ПІСЛЯ КОНТАКТУ ІЗ ВІРУСОМ, ПЕРЕВИЩУЄ

80%



1/3

ХВОРИХ НА КІР СПОСТЕРІАЮТЬСЯ РІЗНОМАНІТНІ УСКОПЛЕННЯ, ПОЧИНАЮЧИ ВІД ПНЕВМОНІЇ І ЗАКІНЧУЮЧИ МІОКАРДИТОМ ТА ЕНЦЕФАЛІТОМ (ЗАПАЛЕННЯМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ)



ЕНЦЕФАЛІТ ТРАПЛЯЄТЬСЯ РІДКО, ПРОТЕ ЯКЩО ВІН РОЗВИВАЄТЬСЯ, ТО ПОВ'ЯЗАНИЙ З ВИСОКИМ

# ОБЕРЕЖНО КІР



## ІНКУБАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

У СЕРЕДНЬОМУ  
8 - 12 ДНІВ /ТРИВАЄ 14 ДНІВ



## ПЕРЕДАЧА ІНФЕКЦІЇ

ВІД 1 ДО 2 ДНІВ  
ДО НАСТАННЯ ВИСИПУ  
ТА ДО 4 ДНІ ПІСЛЯ ВИСИПУ



## УСКЛАДНЕННЯ

- ПНЕВМОНІЯ
- СЛІПОТА
- ЕНЦЕФАЛІТ
- ВУШНІ ІНФЕКЦІЇ
- ДІАРЕЯ ТА ЗНЕВОДНЕННЯ



## ЛІКУВАННЯ

ЯКЩО УСКЛАДНЕНЬ НЕМАЄ,  
ТРЕБА ПОБІЛЬШЕ ВІДПОЧИВАТИ,  
КОНТРОЛЮВАТИ ТЕМПЕРАТУРУ  
ТА ПИТИ БАГАТО ВОДИ

## ПРИЧИНА ІНФЕКЦІЇ

ЧЕРЕЗ КАШЕЛЬ  
І ЧХАННЯ,  
ТІСНИЙ ОСОБИСТИЙ  
КОНТАКТ



## СИМПТОМИ ХВОРОБИ

- НЕЖИТЬ
- КАШЕЛЬ
- ПОЧЕРВОНІННЯ ОЧЕЙ І СЛИЗОТЕЧА
- БІЛІ ПЛЯМИ НА ВНУТРІШНІЙ ПОВЕРХНІ ШІК
- ЗНАЧНЕ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
- ЧЕРЕЗ КІЛЬКА ДНІВ З'ЯВЛЯЄТЬСЯ ВИСИП - ВІД ВОЛОССЯ ДО ШІЇ, ПЕРЕДПЛІЧЧЯ, РУК І НІГ




## ПРОФІЛАКТИКА

ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ КОРУ -  
ЦЕ НАІЕФЕКТИВНІШИЙ  
СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ІМУНІТЕТУ ТА ЗАПОБІГАННЯ  
ЗАХВОРЮВАННЮ



# Календар профілактичних щеплень

Чинний, затверджений Міністерством охорони здоров'я України в 2016 році



\*Інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) | \*\*Оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ)

[vaccination.com.ua](http://vaccination.com.ua) | [moz.gov.ua](http://moz.gov.ua)

Імунізація проти низки захворювань може проводитися комбінованими вакцинами, що зменшує кількість уколів і візитів до поліклінік.

T

Трибуна  
МЕДІАФОНА ПРеса.СІУМ